

Коронавирусная инфекция (COVID-19)

- Коронавирус - оболочечный вирус с одноцепочечной РНК
- Большинство типов коронавирусов вызывают респираторные заболевания с лёгким течением и излечением в период 14 суток.
- Однако за последние 20 лет коронавирусы вызвали уже третью вспышку заболеваемости с высокой летальностью:
 - 2002 - SARS-CoV летальность до 10% и до 25% среди беременных Wong 2003
 - 2012 - MERS-CoV летальность до 37% Zaki 2012
 - 2019 - SARS-CoV-2 (COVID-19).
- 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса
- На 26 марта 2020 г. :
 - выявлено **332 000** инфицированных
 - зарегистрировано **21 160** смертей (4,53%)
 - излечилось **113 800** человек

Коронавирусная инфекция (COVID-19) и беременность

Эпидемиология



- Основной путь передачи – от человека к человеку (*воздушно-капельный, фекально-оральный и контактно-бытовой*)
- Имеющиеся данные не позволяют считать, что беременные женщины более восприимчивы к заражению COVID-19. Сообщений о случаях гибели беременных женщин до настоящего времени нет
- Данных за повышение частоты акушерских осложнений (прерывание беременности, спонтанных преждевременных родов, инфекционных осложнений) в настоящий момент нет
- Данных за возможность перинатальной вертикальной передачи COVID-19 нет

Коронавирусная инфекция (COVID-19) и беременность

Методы лабораторной диагностики

- Мазок со слизистой носоглотки
- Иммунологическое исследование крови

время получения ответа м.б. сокращено до 10-30 минут, серонегативный период до 7 дней



Коронавирусная инфекция (COVID-19) и беременность

Профилактика инфицирования при оказании медицинской помощи беременным на амбулаторном этапе

- Рекомендации для беременных пациенток по профилактике инфицирования не отличаются от таковых для общей популяции
- Посещение женской консультации при согласовании периодичности и времени с лечащим врачом
- Использование мер индивидуальной защиты
- Тотальное тестирование беременных на COVID-19 в настоящее время не рекомендовано
- Пренатальная диагностика не противопоказана

Коронавирусная инфекция (COVID-19) и беременность

Рекомендации для беременных, угрожаемых по инфицированию/носителей COVID-19 без симптомов ОРВИ:

- Беременные, при возвращении из-за рубежа, или те кто имел возможный контакт с потенциальным носителем COVID-19, **обязаны** сообщить об этом в центр чрезвычайных ситуаций – **112**, принять меры по самоизоляции на 14 дней
- Сообщить о своем состоянии врачу женской консультации, согласовать график посещений
- Периодически осуществлять термометрию и контроль общего самочувствия
- Проводить периодическую уборку и проветривание помещения
- Использовать индивидуальные средства гигиены и столовые принадлежности
- Если медицинский осмотр не может быть отложен до окончания периода изоляции, оптимально его организовать в месте изоляции с использованием медицинскими сотрудниками всех мер методы индивидуальной защиты.
- Медицинским работникам организовать полное клинико-лабораторное обследование состояния матери и плода по окончании периода изоляции

Коронавирусная инфекция (COVID-19) и беременность

Начальные клинические проявления COVID-19 у беременных рожениц и родильниц:

- так, как основное число беременных относятся к пациентам молодого возраста, у них возможно бессимптомное или легкое течение заболевания
- Однако пристального внимания, особенно у беременных с хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, системными иммунными и онкологическими заболеваниями, заслуживает появление признаков :
 - Кашля
 - Повышения температуры тела
 - Одышки
 - Диареи
 - Появление значимых признаков ОРВИ у беременных – показание для госпитализации в **специализированное** родовспомогательное учреждение